

ドセタキセル + カルボプラチン +フルオロウラシル

適応疾患：頭頸部がん・扁平上皮がん

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	デキサート注	3.3mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	ドセタキセル	50~70mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
6	カルボプラチン	AUC4~5	点滴静注	120~240分
	生食	500mL		
7	フルオロウラシル	500~750mg/m ²	点滴静注	20~24時間
	生食	1000mL		

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1				↓	↓	↓																						
2	↓	↓	↓	↓	↓																							
3	↓	↓	↓		↓	↓																						
4				↓																								
5	↓																											
6				↓																								
7	↓	↓	↓	↓	↓																							

投与順序 day1: 2→3→5→7 day2、3、5: 2→3→7 day4: 1→2→4→6→7