

ドセタキセル + シスプラチン + フルオロウラシル

適応疾患：頭頸部がん

1コースの期間：3~4週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	デキサート注 生食	day1-3: 3.3mg	点滴静注	15分
		day5、6: 6.6mg 50mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
6	ドセタキセル	50~60mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
7	シスプラチン	60~70mg/m ²	点滴静注	120~240分
	生食	500mL		
8	フルオロウラシル	500~750mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	1000mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1				↓	↓	↓															
2	↓	↓	↓	↓	↓																
3	↓	↓	↓		↓	↓															
4				↓																	
5				↓																	
6	↓																				
7				↓																	
8	↓	↓	↓	↓	↓																

投与順序 day1: 2→3→6→8 day2、3、5: 2→3→8 day4: 1→2→4→5→7→8