

CapeOX(カペシタビン+オキサリプラチン)

適応疾患：原発不明癌

1コースの期間：3週間

上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
3	アロキシ注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	5%ブドウ糖液	100mL		
4	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	120分
	5%ブドウ糖液	500mL		
5	カペシタビン		内服	朝夕食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

投与順序 1→2→3→4

特記事項

*カペシタビン投与量(C法)

体表面積	1回量
1.96 m ² ≤	2100mg
1.66 m ² ~ 1.96 m ²	1800mg
1.36 m ² ~ 1.66 m ²	1500mg
1.36 m ² >	1200mg