## パクリタキセル+カルボプラチン

適 応 疾 患 : 原発不明癌

<u>1コースの期間</u> : 3週間 <u>上限コース回数</u> : なし

_	-tate strain	Tun. 6- E	±п. ⊢ /▽ п/>								
Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間							
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前							
		day2、3:80mg		午前中							
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート							
3	レスタミンコーワ錠	50mg	内服	パクリタキセル投与30分前までに							
4	デキサート注	19.8mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐							
	ファモチジン注	20mg		に静注							
5	グラニセトロン静注	3mg	点滴静注	30分							
	生食	50mL									
6	パクリタキセル	175mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	180分							
	生食	500mL									
7	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分							
	生食	250mL									

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$																		
2	$\downarrow$																				
3	$\downarrow$																				
4	$\downarrow$																				
5	$\downarrow$																				
6	$\downarrow$	·	·	·																	
7	$\downarrow$	·	·	·																	

投与順序 1→2→3→4→5→6→7