## イリノテカン + シスプラチン

適 応 疾 患 : 神経内分泌がん

<u>1コースの期間</u> : 4週間 <u>上限コース回数</u> : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間						
	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前						
		day2、3:80mg		午前中						
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート						
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート						
4	パロノセトロン注	0.75mg	点滴静注	15分						
	デキサート注	9.9mg								
	生食	50mL								
5	イリノテカン	60mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	90分						
	5%ブドウ糖液	250mL								
6	マンニットール注	300mL	点滴静注	30分						
7	シスプラチン	60mg/ <b>m</b> <sup>‡</sup>	点滴静注	90分						
	生食	500mL								
8	フロセミド注(必要に応じて)	20mg	静注	2分(緩徐に静注)						

	day	ау																										
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$																									
2	$\downarrow$																											
3								$\rightarrow$							$\leftarrow$													
4	$\downarrow$							$\rightarrow$							$\downarrow$													
5	$\downarrow$							$\rightarrow$							$\leftarrow$													
6	$\downarrow$																											
7	$\downarrow$																											
8	<b>1</b>						·																					

<u>投与順序</u> day1:1→2→4→5→6→7→8 day8、15:3→4→5