

# イリノテカン + シスプラチン

適応疾患 : 神経内分泌がん

1コースの期間 : 4週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトン注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分
	5%ブドウ糖液	250mL		
6	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
7	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分
	生食	500mL		
8	フロセミド注(必要に応じて)	20mg	静注	2分(緩徐に静注)

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓																											
3								↓							↓													
4	↓							↓							↓													
5	↓							↓							↓													
6	↓																											
7	↓																											
8	↓																											

投与順序 day1: 1→2→4→5→6→7→8 day8、15: 3→4→5